

Enzimler-II

Enzimlerin Önemi

- Enzimatik analizler, hastalık durumlarının belirlenmesi, tanı, prognoz, hastalığın v everilen tedavinin hastalık üzerindeki etkisinin izlenmesi açısından önem taşır.

Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Özellikler

- Enzimin duyarlılığı yüksek olmalıdır.
- Enzim incelenecek dokuya olabildiğince özgül olmalıdır.
- Enzim yüksekliği zamana bağlı olarak değişim göstermelidir.
- Hastalık başladıktan belirli bir süre sonra kanda yükselmelidir.
- İncelenmeye imkan sağlayacak bir süre içerisinde de kanda yüksek miktarlarda kalabilmelidir.

Enzimlerin Klinikte Kullanımı

- Kalıtsal metabolik hastalıklar
- Toksik etkiler
- Kemoterapi
- Vitaminler
- Tedavi
- Tanı

Klinik Açıdan Anlamlı Enzimler

- Laboratuvarıda en sık tayin edilen, klinik açıdan anlamlı başlıca enzimler:
 - **AST:** Aspartat aminotransferaz
 - **ALT:** Alanin aminotransferaz
 - **ALP:** Alkalen fosfataz
 - **LDH:** Laktat dehidrogenaz
 - **CK (CPK):** Kreatin fosfokinaz
 - **GGT:** Gama glutamik asit transferaz
 - **Amilaz, Lipaz**
 - **AP:** Asit fosfataz
 - **G-6-PD:** Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz

Transaminazlar

AST (Aspartat aminotransferaz)

ALT (Alanin aminotransferaz)

- Bir α -aminoasitten bir keto asite amin grubu aktarılmasını katalizler.
- AST (SGOT/serum glutamat oksaloasetat transferaz); aspartat ve α -ketoglutarattan piridoksal fosfatı koenzim olarak kullanarak, oksaloasetat ve L-glutamat oluşumunu katalizleyen bir transaminazdır.
- ALT (SGPT/serum glutamat pirüvat transferaz); alanin ve α -ketoglutarattan piridoksal fosfatı koenzim olarak kullanarak pirüvat ve L-glutamat oluşumunu katalizler.

Transaminazlar

AST (Aspartat aminotransferaz)

ALT (Alanin aminotransferaz)

- Başlıca karaciğer, kas (iskelet ve kalp kası) ve böbrek dokusunda bulunurlar.
- ALT karaciğer için spesifiktir.
- Sağlıklı yetişkinlerde referans aralığı 10-40 U/L'dir.
- Karaciğer hastalıklarında plazmadaki miktarı yükselir.
- Yenidoğanda AST aktivitesinde hafif bir artış gözlenir.
- AST, yaş ile kadınlarda %25-50, erkeklerde %10 artar, ALT azalır.

ALP (Alkalen Fosfataz)

- Karaciğer, kemik, barsak, plasenta izoenzimleri vardır.
- **Fizyolojik artışlar:** Gebelikte, plasentadan da ALP salgılandığından gebelerde enzimin aktivitesi yüksek saptanır. Kemik gelişiminin hızlanmış olduğu çocukluk ve ergenlik çağlarında enzimin aktivitesi yetişkinlerden birkaç kat yüksektir.
- **Patolojik artışlar:** Karaciğer ve safra yolları hastalıkları (sarılık, siroz, safra yollarında taş ve tümör nedeni ile tıkanıklık), kemik hastalıkları

LDH (Laktat Dehidrogenaz)

- Pek çok dokuda bulunan, özgünlüğü düşük bir enzimdir.
- En fazla bulunduğu dokular: Kalp kası, çizgili (iskelet) kas, karaciğer, böbrek, eritrositler ve lökositler, akciğer, lenf bezleri, dalak, beyin
- Doku dağılımlarına göre 5 farklı izoenzimi vardır (LD-1'den LD-5'e kadar)
- Yukarıdaki dokulardan kaynaklanan hastalıklarda enzim aktivitesi yükselir

Kreatin fosfokinaz (CPK)

- ATP aracılığı ile kreatini reversibl olarak fosforilleyen bir enzimdir. Bu reaksiyonda aktivatör Mg^{+2} 'dur.
- En fazla iskelet kasında (çizgili kaslar, kalp kası) olmak üzere beyinde de bulunur.
- Kas kitlesinin azalması ile paralel olarak CPK aktivitesi azalır
- Ağır egzersizden sonra, intramuskuler enjeksiyonlarda, cerrahi operasyonlar sonrası CPK aktivitesi artar.

Amilaz ve Lipaz

- Tükrük bezleri, pankreas ve egzokrin bezlerinde bol miktarda amilaz bulunur.
- Akut pankreatit tanısında yararlı enzimlerdir. Akut pankreatitten sonra serum lipaz seviyesi 2-12 saat içinde normalin dört katından fazla artar ve 48-72 saat içinde normale döner

Gama Glutamik Asit Transferaz (GGT)

- En fazla böbrekte olmak üzere, KC, safra kanalı ve pankreasta mevcuttur.
- Böbrekteki GGT plazmaya salınmadığı için tanısal önemi yoktur.
- GGT, safra kanalı, KC, pankreas hastalıklarında çok yükselir.

Asit Fosfataz (AP)

- Asit pH'da fosfat gruplarını hidrolize eden bir enzimdir.
- Dalak, eritrosit, trombosit, KC ve prostat bezinde bol miktarda bulunur.

Glukoz-6-Fosfat-Dehidrogenaz

- Bu enzimin eksikliği eritrositlerin hemolitik hastalığına (favizm) yol açar.
- Uzamış yenidoğan sarılıklarında, hemolitik hastalıklarda araştırılır.
- Enzim aktivitesinin normalden düşük bulunması tanı koydurucudur.

Enzim Aktivitesi Ölçümlerinin Önem Kazandığı Klinik Durumlar

⊕ Miyokard Enfarktüsü

⊕ Kas Hastalıkları

⊕ Karaciğer Hastalıkları

⊕ Kemik Hastalıkları